

診療科名: 血液内科

申請者名: _____

レジメン名称: R²療法 6~12cycle目

疾患名(癌種): 再発/難治濾胞性リンパ腫及び辺縁帯B細胞性リンパ腫

適用目的(対象): 術前補助化学療法 術後補助化学療法 進行再発 一次 二次以降 三次以降 放射線併用 その他() フォーマットページ数(/)

レジメン記入フォーマット

通しNo	薬品名・規格	投与量	手技	点滴時間・速度	day(1)	day()	day(8)	day()	day(15)	day(21)	day(22)	day	day()	day(28)
①	レブラミド	20mg/日		21日間内服	→									
①														
②														
③														
④														
⑤														
⑥														
⑦														

Ccr ml/min			
	30 ≤ Ccr < 60	< 30 ml/min 透析なし	透析あり
Len	10mg/日で開始し副作用を見ながら15mg/日まで増量可能	5mg/日	5mg/日、透析日は透析終了後に内服

骨髄抑制や皮疹などの副作用発現時の対処は、レブラミド適正使用ガイドに則り対処する。

リツキシマブBS

初回投与時は50mg/hrの速度で30分点滴を行い、問題なければその後30分毎に50mg/時間ずつ増量し、最大400mg/時間まで増量できる。

2回目以降は、初回投与時にIRRが軽微または無かった場合は、100mg/時間で開始し、その後30分毎に100mg/時間ずつ増量して、最大400mg/時間まで増量できる。

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値

インターバル 28 日

レジメン基準日 day()

総クール数 12 ()クール

※この表にてオーダーリングにレジメン登録しますので、漏れなく記入して下さい。

【投与基準】

好中球数 ≥ 1,000/μ L、血小板数 ≥ 7.5万/μ L
 総ビリルビン ≤ 3.0mg/dlが望ましい。
 G-CSFや輸血、副腎皮質ホルモン等の治療により対処

レジメン登録コード _____

レジメン審査部承認日 2023/1/13