

診療科名: 血液内科 _____

申請者名: _____

レジメン名称: ガザイバ (A法) Cyxel 1

疾患名(癌種): CD20陽性濾胞性リンパ腫

適用目的(対象): 術前補助化学療法 術後補助化学療法 進行再発 一次 二次以降 三次以降 放射線併用 その他()

レジメン記入フォーマット

全身状態の観察はガザイバ投与終了後最低2時間継続する。

フォーマットページ数(/)

通しNo	薬品名・規格	投与量	手技	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()	day(8)	day()	day(15)	day()
1	★デキサメサゾン(6.6mg/v) or プレドニゾン 生理食塩液 100mL	19.8mg DEX or 100mg PDN 1P	点滴注射	30分点滴 ガザイバ投与60分前 (60分~12時間前) (プレドニンは内服も可能)	◆						◆		◆	
2	ロキソプロフェン錠60mg内服、またはアセトアミノフェン600mg内服 またはアセロオ点滴 1000mg 15分点滴 ガザイバ投与30分前(30分~60分前) レスタミンコーワ錠50mg内服、またはボラミン注 5mg ガザイバ投与30分前(30分~60分前)				●						●		●	
3	生理食塩液 100mL	1P	点滴注射	60分かけて プレメディ後時間経過用	●						●		●	
4	ガザイバ点滴静注 1000mg 生理食塩液 250mL 全量 250mLとする フィルター付きルート使用	1000mg/body 210mL	点滴注射	5ml/時で30分で開始 ↓ 30~60分:10ml/時 60~90分:20ml/時 IRRなければ30分ごとに 20ml/時ずつ増量 ↓ 100ml/時まで増量可 *ガザイバは2回目投与以降、輸注反応がなければ、投与速度を上げて 開始することもあり。0~30分:5ml/時、30~60分:10ml/時→ 60~90分:20ml/時→30分ごとに20ml/時ずつ最大100mL/時まで増加可能	↓						↓		↓	
与速度は、2回目以降も初回と同様の速度で登録(申請医師より申出あり、初回での輸注反応強かった)											*		*	
5	生理食塩液 100mL デキサメサゾン注 6.6mg	1P 6.6mg~19.8mg	点滴注射	30分かけて ガザイバ投与時間が4時間を超える場合は、 上記副腎皮質ホルモンを4時間後に追加投与可能(検討する)。 ※種類と投与量は医師の判断により適宜変更可能	●						●		●	
6	生理食塩液 50mL	1P	点滴注射	30分かけて 経過観察用	●						●		●	

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
4	ガザイバ点滴静注 1000mg	1000mg	1000mg

インターバル 21 日

レジメン基準日 day (1, 8, 15)

総クール数 (1)クール

週1回毎投与して3回/コース

2~6コース目は1回/コース

BDMでは4週毎、THPCOPでは3週毎併用投与

★ DEX=12mgに減量も可能(IRRがない場合)

※この表にてオーダーリングにレジメン登録しますので、漏れなく記入して下さい。

【投与基準】
THPCOPやBendamustine療法の開始基準に準ずる

レジメン登録コード 血内100

レジメン審査部承認日 2019.2.8

レジメン変更承認日 2019.3.8