

診療科名: 血液内科
 申請者名: _____
 レジメン名称: IsaDex-2コース目以降

レジメン記入フォーマット

疾患名(癌種): 多発性骨髄腫
 適用目的(対象): 術前補助化学療法 術後補助化学療法 進行再発 一次 二次以降 三次以降 放射線併用 その他()

フォーマットページ数(/)

通しNo	薬品名・規格	投与量	手技	点滴時間・速度	day(1)	day()	day(8)	day()	day(15)	day()	day(22)	day()	day()	day()
	Premedication													
1	生食	100ml	点滴注射	30分点滴										
1'	ボラミン (レスタミン25~50mg)	1A		サークリサ投与1時間前に開始	◆				◆					
1'	ファモチジン	1v		divまたは内服投与										
1'	レナデックス 内服	40mg		<75歳	●		●		●		●			
		20mg		≥75歳										
2	モンテルカスト	10mg/錠		内服										
2	アセリオ	1g/v	点滴注射	15分点滴	■				■					
2'	アセトアミノフェン	650~1000mg		内服										
サークリサ投与30分前までに前投与は終了														
3	サークリサ	20mg /kg	点滴注射	初回 175mg/時間x1時間 輸注反応なければ 50mg/30分ずつ増加可能 Max.400mg /時間まで。	↓				↓					
	生食	250ml		2回目以降175mg/hrx1時間 275mg/hrx30分のように 100mg/hr増量。 →375mg/hr→400mg/hr										
4	生食	50ml	点滴注射	15分点滴	▲				▲					

Premedicationは初回投与時はdiv推奨

初回投与後IRRなければボラミン、ファモチジ等は内服に変更可能。

$$\text{点滴速度} = \{ \text{投与速度 (mg/hr)} \times 12.5 \text{ml} \cdot \text{kg/mg} \} / \text{体重 (kg)}$$

初回 175mg/時間x1時間→30分毎に50mg/時間ずつ増量して400mg/時間まで
 2回目以降:175mg/時間x1時間→30分毎に100mg/時間ずつ増量して400mg/時間まで
 初回:3時間34分、2回め以降:3時間15分程度かかる。

重50kgのPt初回投与 :44ml/hrx1時間→69ml/hr30分→94ml/hr30分→100ml/hr終

Grade≥3のIRR発生時は投与を中止して再投与しない。

- Grade≤2のIRR発生時:Grade1以下に回復するまで休業。
- Grade1以下に回復したら、87.5mg/時間の投与速度で再投与可能。
- 再投与後30分以内にIRR再発無ければ、30分毎に50mg/時間ずつ最大400mg/時間まで投与速度増量が可能であるが、慎重に行う事。

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
3	サークリサ	20mg/kg	

インターバル日数 28日
 レジメン基準日 day(1)
 総クール数 ()クール

※この表にてオーダーリングにレジメン登録しますので、漏れなく記入して下さい。

【投与基準: 好中球数>1,000/μ L
血小板数≥7.5万/μ L 骨髄中形質細胞<50%
血小板数≥3.0万/μ L 骨髄中形質細胞≥50%
Cor≥30ml/min、T-Bil:≤2xUL、AST・ALT≤3xUL 補正Ca値≤14mg/dl

レジメン登録コード _____
 レジメン審査部会承認日 _____