

診療科名: 産婦人科

# レジメン記入フォーマット

申請者名: \_\_\_\_\_

レジメン名称: キイトルーダ(MSI不要)(200mg/3週ごと)+レンビマ併用療法

疾患名(癌種): 子宮体癌(再発)(がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌)

適用目的(対象): 術前補助化学療法 術後補助化学療法 進行再発 一次 二次以降 三次以降 放射線併用 その他(適正使用ガイドライン)

フォーマットページ数( / )

通しNo	薬品名・規格	投与量	手技	点滴時間・速度	day( 1 )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( 21 )
1	生理食塩液100mL	1P	点滴注射	30分で	●									
2	生理食塩液 100mL	1P	点滴注射	30分で	●									
	キイトルーダ点滴静注 フィルター付きルート使用	200mg/body												
3	生理食塩液100mL	1P	点滴注射	30分で 流し用	●									
					連日内服									
①	レンパニチブ(レンビマ)	20mg	内服	連日内服										

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
2	キイトルーダ点滴静注	200mg/body	-
①	レンビマcap(レンパチニブ)	20mg/day	
		(減量して投与を継続する場合には、1日1回 14mg、10mg、8mg、又は4mgに減量すること)	

・レンビマ  
※高血圧、蛋白尿、骨髄抑制、肝障害、心機能不全、創傷治癒遅延

インターバル日数 ( 21 )日  
 レジメン基準日 day( 1 )  
 総クール数 ( )クール

※この表にてオーダーリングにレジメン登録しますので、漏れなく記入して下さい。

【投与基準、※定期的に、CK、AMY、血糖値、内分泌機能を検査する
WBC 1,000以上
PLT 10万以上
肝・腎機能生涯 軽度まで
甲状腺機能 正常

レジメン登録コード 婦48  
 レジメン審査部会承認日 2022/1/14

副作用、貧血、骨髄抑制、肝障害、腎機能低下、甲状腺機能低下、骨格形成不全、  
疲労、低カルシウム血症、甲状腺機能低下、下痢、発疹 に注意

変更承認日

---

---