

# レジメン記入フォーマット

診療科名: 産婦人科

記入医師名: \_\_\_\_\_

レジメン名称: TC + Bevacizumab療法

疾患名(癌種): 卵巣癌、卵管癌、腹膜癌、子宮頸癌

適用目的(対象): 術前補助化学療法 術後補助化学療法 進行再発 一次 二次以降 三次以降 放射線併用 その他(ガイドライン 卵巣・卵管・腹膜癌:術後補助化学療法 子宮頸癌:IVB期一次

フォーマットページ数( 1 / 1 )

通しNo	薬品名・規格	投与量	手技	点滴時間・速度	day( 1 )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	パロノセトロンバッグ注0.75mg	1P	点滴注射	30分かけて	●									
	デキサート注射液6.6mg	2V												
	デキサート注射液1.65mg	2A												
	ファモチジン注 20mg	1A												
	ボララミン注 5mg	1A												
	アロカリス柱235mg	1V												
2	生食 50mL	1P	点滴注射	10分かけて	●									
3	生理食塩液 100mL	1P	点滴注射	初回 : 90分	●									
	<b>アバステン点滴静注用</b>	<b>15mg/kg</b>		2回目 : 60分										
				3回目以降 : 30分										
4	生理食塩液500mL	1P	点滴注射	3時間かけて	●									
	<b>パクリタキセル注射液</b>	<b>175mg/m<sup>2</sup></b>												
5	5%ブドウ糖液250mL	1P	点滴注射	1時間かけて	●									
	<b>カルボプラチン注射液</b>	<b>目標AUC 5</b>												
6	生食 50mL	1P	点滴注射	15分かけて	●									

※【Calvertの式】カルボプラチンの投与量(mg/body) = 目標AUC × (GFR + 25)

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
3	<b>アバステン</b>	15mg/kg	
4	<b>パクリタキセル注射液</b>	175mg/m <sup>2</sup>	180mg/m <sup>2</sup>
5	<b>カルボプラチン</b>	目標AUC 5	目標AUC 6

インターバル日数 ( 21~28 ) 日

レジメン基準日 day( 1 )

総クール数 ( 6 )クール

※この表にてオーダリングにレジメン登録しますので、漏れなく記入して下さい。

【投与基準】ベバシズマブ投与時の減量・中止基準  
 標準レジメンTCの2コース目からベバシズマブを併用したレジメンとする  
 好中球:15000/m<sup>3</sup>以上、かつ血小板10万/m<sup>3</sup>以上に回復するまで休業

レジメン登録コード 婦24

レジメン審査部会承認日 2016年6月27日承認

レジメン変更承認日 2020.2.14, 2020.4.22