

# レジメン記入フォーマット

診療科名: 産婦人科

申請者名: \_\_\_\_\_

レジメン名称: PLD+CBDCA

疾患名(癌種): 卵巣癌・卵管癌・腹膜癌

適用目的(対象): 術前補助化学療法 術後補助化学療法 進行再発 一次(TCが使用出来ない患者) 二次以降 三次以降 放射線併用 その他()

フォーマットページ数( / )

通しNo	薬品名・規格	投与量	手技	点滴時間・速度	day( 1 )	day( 2 )	day( 3 )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( 21 )
主管														
①	5% Glu 500mL	500mL	点滴注射	40ml/hr 終了後残破棄	●									
側管														
②	デキサート 6.6mg	1A	点滴注射	30分で	●									
	ロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50ml	50mL												
	アロカリス注235mg	1V												
③	リボゾーム化ドキソルピシン(ドキシル)	30mg/m2	点滴注射	1時間で	●									
	5% Glu 250mL													
	【禁!】フィルター													
④	カルボプラチン	AUC 5	点滴注射	1時間で	●									
	5% Glu 250mL	(AUC 6)												
⑤	生理食塩液 50ml	1P	点滴注射	10分で	●									

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
②	リボゾーム化ドキソルピシン(ドキシル)	30mg/m2	—
③	カルボプラチン	AUC 5	AUC 6

インターバル日数 ( 21~28 )日  
 レジメン基準日 day( 1 )  
 総クール数 ( 6 )クール  
 (目安)

※この表にてオーダーリングにレジメン登録しますので、漏れなく記入して下さい。

【投与基準】 ※ドキシル投与中のクーリングを行う  
 白血球3000以上 好中球 1500以上 血小板 10万以上  
 好中球数<500, Plt <5万未満が7日以上続くとき 20%減量  
 皮膚障害 Grade2: Grade1 以下になるまでPLD最大2週間休薬  
 Grade3以上:PLD休薬、2週間以内に消失した場合25%減量で再開

レジメン登録コード 婦45

レジメン審査部会承認日 2021/9/10

レジメン変更承認日 \_\_\_\_\_